



डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला

# कृषि विज्ञान केंद्र



सेलसुरा ता.जि.वर्धा - ४४२९०९ (महाराष्ट्र)

डॉ. जिवन रा. कतोरे  
वरीष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख

फो - ८२७५४९२०९२

Email - [kvkselsura@pdkv.ac.in](mailto:kvkselsura@pdkv.ac.in) / [kvk.wardha@gmail.com](mailto:kvk.wardha@gmail.com)

## गाभण शेळ्यांची पावसाळ्यात काळजी कशी घ्यावी ?

शेळीपालनाचे यश कळपामध्ये जन्माला येणाऱ्या करडांवर अवलंबून असते. त्यासाठी शेळी गाभण असणे आवश्यक आहे. दोन वर्षाला तीन वेळेस शेळी व्याली पाहिजे. शेळीपालन व्यवसायामध्ये संगोपनाला जितके महत्त्व आहे तितकेच महत्त्व गाभण शेळीच्या आरोग्य व व्यवस्थापनेला सुद्धा आहे. पावसाळ्यात गाभण शेळ्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. गाभण शेळ्यांच्या व्यवस्थापनात कोणत्या गोष्टीचा अंतर्भाव होतो याविषयीची माहिती पाहुया.

### गाभण शेळ्यांचा आहार

गाभण शेळ्यांना वाळलेला ओला चारा, खुराक व खनिज मिश्रण यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. गाभण शेळ्यांना सहज पचणारा चारा योग्य प्रमाणात पशुखाद्य द्यावा. गाभण काळातील शेवटचे किमान १ महिना व्यायाच्या अगोदर समतोल आहाराचा पुरवठा करावा व गोठ्यातच फिरण्याची सोय असणे गरजेचे आहे. थंड पाणी किंवा पावसाचे पाणी देऊ नये त्यामुळे शेळीला सर्दी सारखे आजार होऊ शकतात, शेळ्यांना नेहमी स्वच्छ पाणी द्यावे. शक्यतो पावसाळ्यात गाभण शेळ्यांना सुका चारा द्यावा जसे कि भरडलेला मका, गहू सोयाबीन यांचे मिश्रण करून द्यावे. गाभणकाळात शेवटच्या ३-४ आठवड्यामध्ये गर्भाशयातील पिल्लांच्या वाढीसाठी उत्तम प्रतीचा चान्याबरोबरच दररोज २५० ते ३५० ग्राम खुराक द्यावा.

### गाभण शेळ्यांची लक्षणे

शेळी गाभण झाल्यावर तिची त्वचा तजेलदार होते. एक वेळ गाभण गेलेली शेळी पुढील २१ दिवसात परत माजावर येत नाही. तीन महिन्यांनंतर शेळीचे पोट वाढू लागते व तसेच शेळीचे वजन वाढलेले दिसून येते. शेळी गाभण आहे की नाही हे ओळखण्यासाठी नवीन पद्धतीमध्ये एकसे, सोनोग्राफी, लॉप्रोस्कोपी या तपासण्या खूपच विश्वसनीय मानल्या जातात, शेवटच्या गाभण काळात शेळीची कास मोठी होते.

### गोठ्याचे व्यवस्थापन


सध्याचा हवामानात शेळ्यांचे पावसापासून तसेच आद्रतायुक्त हवेपासून बचाव करण्यासाठी गाभण शेळ्यांचा गोठ्यात उबदार वातावरण रहावे म्हणून साधारण १०० ते २०० वॉट पावरचे बल्ब लावावेत. शेळ्यांचा गोठा कोरडा राहील याची दक्षता घावी तसेच रात्रीच्यावेळी गोठ्यात वाळलेले गवत अंथरावे जेणेकरून जमिनीतील गारवा व ओलसरपणा याचा गाभण शेळ्यांना त्रास होणार नही. गाभण असनाऱ्या शेळ्या बसण्याची जागा मलमुत्रामुळे ओली होते अशा ओलसर ठिकाणी आठवड्यातुन एक दोन वेळा चुन्याची भुकटी

टाकावी. त्यामुळे गोढ्यात असलेले जीवाणू, विषाणू यांचा प्रादुर्भाव गाभण शेळ्यावर कमी होतो. गाभण शेळ्यांना इतरांपासून वेगळ्या जागी ठेवावे.

## पावसाळ्यात गाभण शेळ्यांना होणारे आजार

गाभण शेळ्यांमध्ये पावसाळ्यात गर्भपात, अंग बाहेर येणे, पोटफुगी, आंत्रविषार, बुळकांडी, अपचन, अशा प्रकारचे आजार उद्भवतात. पावसाळ्यात आद्रितेचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे शेळ्यांना श्वसनाचे आजार होण्याची दाट शक्यता असते. गोढ्यातील जमीन ओली असेल तर खुरांमध्ये ओलसरपणा राहून शेळ्यांचा खुरामध्ये जखमा होतात. पावसाळ्यात हिरवा ओला चारा जास्त प्रमाणात उपलब्ध असतो त्यामुळे गाभण शेळ्यांमध्ये अंग बाहेर येणे हा आजार मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो असे असल्यास पशुवैद्याकाकडून योग्य उपचार करून घ्यावेत.

असे आव्हाहन डॉ. सचिन मुळे, विषय विशेषज्ञ (पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र) तसेच डॉ. जिवन कतोरे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जिल्हा वर्धा यांच्या वर्तीने पशुपालक शेतकरी बांधवांना करण्यात येत आहे.

  
**Subject Matter Specialist**  
(AHDSE)  
**KVK, SELSURA, Dist. Wardha**

  
ग्रामेष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख  
कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा  
जि. वर्धा